

Ryeqo 40 mg/1 mg/0,5 mg Filmtabletten. Zusammensetzung: Jede Filmtablette enthält 40 mg Relugolix, 1 mg Estradiol (als Hemihydrat) und 0,5 mg Norethisteronacetat. Sonst. Bestandteile: Lactose-Monohydrat, Mannitol, Poly(O-carboxymethyl)stärke-Natriumsalz, Hydroxypropylcellulose, Magnesiumstearat, Hypromellose Typ 2910, Titandioxid, Triacetin, Eisen(III)-hydroxid-oxid x H₂O. **Anwendungsgebiet:** Zur Behandlung mäßiger bis starker Symptome von Uterusmyomen bei erwachsenen Frauen im gebärfähigen Alter. **Gegenanzeigen:** Überempfindlichkeit gg. d. Wirkstoffe o. sonst. Bestandteile, bestehende o. frühere venöse thromboembolische Erkrankung, bestehende o. frühere arterielle thromboembolische kardiovaskuläre Erkrankung, bekannte thrombophile Erkrankungen, bekannte Osteoporose, Kopfschmerzen mit fokalen neurologischen Symptomen o. Migräne mit Aura, bekannte o. vermutete sexualhormonabhängige Malignome, bestehende o. vorausgegangene (benigne oder maligne) Lebertumoren, bestehende o. vorausgegangene schwere Lebererkrankung, sofern sich die Leberfunktionswerte nicht normalisiert haben, Schwangerschaft, vermutete Schwangerschaft u. Stillzeit, Blutungen unbekannter Ursache im Genitalbereich, begleitende Anwendung hormoneller Kontrazeptiva. **Nebenwirkungen:** **Häufig:** Hitzewallungen, Uterusblutung (umfasst Menorrhagie und Metrorrhagie), Reizbarkeit, Dyspepsie, Alopezie, Hyperhidrosis, nächtl. Schweißausbrüche, Mamma-Zyste, Libido vermindert. **Gelegentlich:** Uterine Ausstoßung eines Myoms. **Warnhinweise:** Enthält Lactose. **Verschreibungspflichtig.** **Zulassungsinhaber:** Gedeon Richter Plc., Gyömrői út 19-21., 1103 Budapest, Ungarn. **Stand der Information:** Juli 2021.