

COVID-19 während der Schwangerschaft – Symptome oft langanhaltend

Datum: 13.10.2020

Original Titel:

Clinical Presentation of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) in Pregnant and Recently Pregnant People

Kurz & fundiert

- Wissenschaftler analysierten die Symptome von SARS-CoV-2-infizierten Frauen, die schwanger waren oder vor höchstens 6 Monaten entbunden haben
- Die ersten Symptome waren vielfältig – am häufigsten war Husten
- Die Symptome hielten im Median 37 Tage an

MedWiss – Die COVID-19-Symptome von schwangeren Frauen oder Frauen, die vor kurzem entbunden hatten, waren vielfältig. Bei jeder 5. Frau äußerte sich COVID-19 zuerst durch Husten. Die Symptome hielten lange an – im Median 37 Tage lang.

Wie äußert sich eine Infektion mit dem neuen Coronavirus SARS-CoV-2 bei schwangeren Frauen oder Frauen, die vor kurzem entbunden haben? Diese Frage stellten sich Wissenschaftler aus den USA und analysierten die Daten von schwangeren Frauen oder Frauen, die vor höchstens 6 Wochen entbunden haben. Die Frauen hatten sich entweder nachweislich mit SARS-CoV-2 infiziert oder eine solche Infektion wurde vermutet. Die Wissenschaftler interessierten sich unter anderem für die Art und Dauer der COVID-19-Symptome.

594 der Frauen hatten sich nachweislich mit SARS-CoV-2 infiziert

991 Frauen wurden zwischen dem 22. März 2020 und dem 10. Juli 2020 in die Studie aufgenommen. 736 von ihnen hatten zum Zeitpunkt des Coronatests Symptome, die auf COVID-19 hindeuteten. Von diesen 736 symptomatischen Frauen hatten 594 einen positiven Coronatest. Bei den restlichen 142 Frauen war der Test negativ. Die Frauen, die sich mit SARS-CoV-2 infiziert hatten, waren durchschnittlich 31,3 Jahre alt. 37 % von ihnen hatten zuvor noch kein Kind geboren. Das durchschnittliche Gestationsalter der Frauen lag bei 24,1 Wochen. 13 % der Frauen hatten die Geburt bereits hinter sich.

Die Symptome waren vielfältig und oft langanhaltend

Folgende Symptome traten bei den Frauen, die positiv auf SARS-CoV-2 getestet wurden, häufig als Erstes auf:

- Husten (20 %)
- Halsschmerzen (16 %)
- Gliederschmerzen (12 %)
- Fieber (12 %)

Die Symptome dauerten im Median 37 Tage lang an. Jede vierte Frau mit COVID-19 hatte mindestens 8 Wochen lang mit den Symptomen zu kämpfen.

Frauen, die sich während der Schwangerschaft oder bis zu sechs Wochen nach der Geburt mit SARS-CoV-2 infizierten, zeigten somit unterschiedliche Symptome. Oftmals hielten diese lange an.

Referenzen:

Afshar Y, Gaw SL, Flaherman VJ, Chambers BD, Krakow D, Berghella V, Shamshirsaz AA, Boatman AA, Aldrovandi G, Greiner A, Riley L, Boscardin WJ, Jamieson DJ, Jacoby VL. Clinical Presentation of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) in Pregnant and Recently Pregnant People. *Obstet Gynecol.* 2020 Oct 7. doi: 10.1097/AOG.0000000000004178. Epub ahead of print. PMID: 33027186.