

Husten, Dyspnoe und Knisterrasseln: Kardinalsymptome der idiopathischen Lungenfibrose (IPF)

Husten ist einer der häufigsten Anlässe für einen Arztbesuch¹ und ein unspezifisches Symptom mit einer Vielzahl an Differentialdiagnosen, das zur weiteren Abklärung in rund 40 % eine Überweisung zum Pneumologen erfordert.^{2,3} Husten und auch die Belastungsdyspnoe sind die häufigsten Symptome von Lungenerkrankungen⁴ - wie auch von der idiopathischen Lungenfibrose (IPF). Doch welche Symptome deuten noch auf eine IPF hin?

Denken Sie bei Patienten über 60 mit einer Kombination der folgenden Symptome und Anzeichen sofort an die idiopathische Lungenfibrose:⁵ Husten, Dyspnoe, Trommelschlegelfinger und Knisterrasseln.

Die basale Auskultation des endinspiratorischen Knisterrassels ist neben den unspezifischen Symptomen entscheidend, um einen frühen Verdacht der idiopathischen Lungenfibrose zu äußern.⁵

Endinspiratorisches Knisterrasseln erkennen

Erfahren Sie im folgenden Video alles rund um die typischen Anzeichen der IPF und wie Sie diese erkennen können.

[Video jetzt ansehen](#)

Weitere Informations- und Serviceangebote rund um die IPF stehen Ihnen auch auf www.Boehringer-interaktiv.de zur Verfügung.

IPF: idiopathische Lungenfibrose

1. Berliner D et al., Dtsch. Ärzteblatt Online (2016).doi:10.3238/arztebl.2016.0834.

2. DEGAM-Leitlinie 2014.

3. Chung KF et al. Lancet 2008;37:1364-74.

4. <https://www.msdmanuals.com/de-de/heim/lungen-und-atemwegserkrankungen/symptome-vonlungenerkrankungen/> (zuletzt abgerufen am 04.12.2018).

5. Raghu G et al. Am J Respir Crit Care Med. 2018;198(5):e44-e68.

6. Cottin V and Cordier JF. Eur Respir J. 2012;40:519-21.

<https://www.boehringer-interaktiv.de/pflichttext-ofev>

PC-DE-105188

Mit freundlicher Unterstützung der Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG