

Kalenderwoche 18/2019 - medikamentöse Behandlung

Medikamentöse Behandlung

Für die Behandlung von Colitis ulcerosa stehen verschiedene Wirkstoffe zur Verfügung. Bei einer leichten bis mittelschweren Colitis ulcerosa kommt in der Regel Mesalazin zum Einsatz. In einer Studie dieser Woche untersuchten Wissenschaftler, welche Anwendungsform und welche Dosis sich am besten für das Erreichen und den Erhalt einer Ruhephase eignen.

Bei einer hartnäckigen Colitis ulcerosa ist die Behandlung komplizierter - und zwar auch deshalb, weil mehr verschiedene Wirkstoffe eingesetzt werden können. Wegen der vielen Möglichkeiten ist es schwierig, eine geeignete Reihenfolge festzumachen, in der die Wirkstoffe im Krankheitsverlauf angewandt werden sollten. Wissenschaftler beschrieben in einer weiteren Studie dieser Woche typische Behandlungspfade von Patienten mit einer hartnäckigen chronischen Darmentzündung.

Hier die Studien im Detail:

- [Leichte bis moderate Colitis ulcerosa: Wie sollte Mesalazin am besten angewandt werden?](#)
- [Behandlungspfade von Patienten mit einer hartnäckigen chronischen Darmentzündung](#)