

Patienten mit Psoriasis-Arthritis leiden vermehrt auch an entzündlichen Augen- und Darmerkrankungen

Datum: 30.03.2018

Original Titel:

Risk of uveitis and inflammatory bowel disease in people with psoriatic arthritis: a population-based cohort study

Viele Patienten mit Autoimmunerkrankungen leiden nicht nur an der eigentlichen Erkrankung, sondern auch an Begleiterkrankungen und -symptomen. Wissenschaftler aus Großbritannien haben jetzt Patienten mit Psoriasis-Arthritis auf ihr Risiko für andere entzündliche Erkrankungen untersucht.

Bei der Psoriasis-Arthritis kommt es zu chronischen Entzündungen der Haut und der Gelenke. Die Psoriasis-Arthritis wird auch zu den Spondyloarthritiden gezählt, einer Gruppe von entzündlich rheumatischen Erkrankungen mit Beteiligung der Wirbelsäule. Bei der Psoriasis-Arthritis kommt es außerdem zu Entzündungen der Nägel, Sehnenansätze, Finger und Zehen. In der Studie wurden jetzt 6783 Patienten mit Psoriasis-Arthritis sowie zur Kontrolle auch Patienten mit Psoriasis und gesunde Teilnehmer untersucht. Patienten mit Psoriasis-Arthritis hatten ein höheres Risiko für die Entstehung von Uveitis und Morbus Crohn im Vergleich zu Psoriasis-Patienten und gesunden Kontrollpersonen. Das Risiko für die Entstehung von Colitis ulcerosa war nicht erhöht.

Die Uveitis ist eine entzündliche Erkrankung der mittleren Augenhaut, die chronisch oder in Schüben auftreten kann. Als Symptome treten Rötungen, vermehrter Tränenfluss, Lichtempfindlichkeit, Sehverschlechterung und Schmerzen auf. Unbehandelt können im Verlauf der Erkrankung schwere Komplikationen wie Verwachsungen, Grauer und Grüner Star oder eine Glaskörpertrübung auftreten. Morbus Crohn und Colitis ulcerosa gehören zu den chronisch entzündlichen Darmerkrankungen. Während eines Schubs treten krampfartige Schmerzen im Bauchbereich und Durchfall auf. Außerdem kann es zu Fieber, Müdigkeit und Schwäche kommen.

Die Wissenschaftler konnten daher einen Zusammenhang zwischen Psoriasis-Arthritis und den anderen entzündlichen Erkrankungen Uveitis und Morbus Crohn herstellen. Patienten mit Psoriasis-Arthritis zeigten ein höheres Risiko für die Entstehung dieser Erkrankungen verglichen mit Psoriasis-Patienten und gesunden Teilnehmern.

Referenzen:

Charlton R, Green A, Shaddick G, et al. Risk of uveitis and inflammatory bowel disease in people with psoriatic arthritis: a population-based cohort study. *Ann Rheum Dis*. November 2017:annrheumdis-2017-212328. doi:10.1136/annrheumdis-2017-212328.